

I CONSIGLI DOPO LA VACCINAZIONE

Dopo la vaccinazione i genitori possono avere dei dubbi su cosa fare se il bambino ha dei disturbi. Cerchiamo di rispondere alle domande più frequenti:

Il mio bambino è irrequieto. Che cosa devo fare?

Dopo la vaccinazione i bambini possono essere particolarmente irrequieti o piangere poiché possono sentire dolore nella sede dell'iniezione o avere la febbre.

- Si può somministrare un farmaco, il "paracetamolo" che aiuta a ridurre il dolore e la febbre.
- Se lo stato di irrequietezza persiste per più di 24 ore consultate il pediatra di base.

La sede d'iniezione è calda, gonfia e arrossata. Che cosa devo fare?

- Applicare un panno pulito e fresco sulla zona dolorosa ed infiammata.
- Se ritenete che il bambino abbia molto dolore poiché reagisce alla minima pressione, potete somministrare il paracetamolo, secondo il peso del bambino, come descritto nella tabella sottoriportata.

Penso che il bambino abbia la febbre. Che cosa devo fare?

- Prima di tutto verificate se è vero e misurate la temperatura del bambino.
Se il bambino ha la febbre:
 - ✓ -dategli da bere in abbondanza
 - ✓ -vestitelo in modo leggero senza coprirlo eccessivamente
 - ✓ -somministrate il farmaco "paracetamolo" come descritto sotto
- Se il bambino continua ad avere la febbre per oltre 24 ore, se la febbre aumenta o il bambino presenta sintomi insoliti, consultate il pediatra o il pronto soccorso.

DOSAGGI PARACETAMOLO

Peso del bambino	GOCCE
3,2 - 6 Kg	14 – 20 gocce ogni 6 ore
7 -10 Kg	35 – 40 gocce ogni 6 ore
11 - 12 Kg	35 – 40 gocce ogni 4 ore

Peso del neonato	SUPPOSTE 62,5 mg
3,2 - 5 Kg	1 supposta ogni 6 ore

Peso del bambino	SUPPOSTE 125 mg
6 - 7 Kg	1 supposta ogni 6 ore
7 - 10 Kg	1 supposta ogni 4 – 6 ore
11 - 12 Kg	1 supposta ogni 4 ore

Peso del bambino	SUPPOSTE 250 mg
11 - 12 kg	1 supposta ogni 8 ore
13 - 20 kg	1 supposta ogni 6 ore