



PROVA DEL RESPIRO – BREATH TEST

Informazioni e regole da seguire per la corretta esecuzione della prova del respiro Breath Test per la ricerca dell'Helicobacter Pylori

L'esame consiste nella raccolta di 2 campioni di respiro, effettuata a distanza di 30 minuti l'una dall'altra.

E' necessario presentarsi a digiuno almeno da 6 ore.

Per tutta la durata del test non si devono assumere cibi o bevande, né fumare.

Si consiglia di sospendere l'assunzione di antibiotici, di composti del bismuto e di inibitori della pompa protonica (omeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo, esomeprazolo) 3-4 settimane prima dell'esecuzione del test in quanto i farmaci possono determinare una falsa negatività dell'esame.

Non è necessario interrompere altre terapie di lunga durata (in particolare terapie anti-ipertensive, cardiovascolari, antiepilettiche, ormonali)

E' consigliabile comunque eseguire il test lontano dall'assunzione di qualsiasi farmaco, in modo da evitare interferenze nell'assorbimento

Non vi sono controindicazioni all'esecuzione del test in gravidanza o durante l'allattamento.

L'esecuzione dell'esame non altera né la capacità di guidare i veicoli né l'utilizzo di altri macchinari.