

---

## CONSENSO INFORMATO ALL'IMPIANTO DI NEXPLANON (68MG ETONOGESTREL)

La sottoscritta \_\_\_\_\_  
nata a \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_, dichiara di essere stata informata  
della possibilità di utilizzo dell'impianto sottocutaneo Nexplanon a scopo contraccettivo e di aver  
compreso le informazioni di seguito elencate:

- l'impianto viene eseguito dal medico nel tessuto sottocutaneo del braccio non dominante, previa inoculazione di anestetico locale
- l'impianto è costituito da una bacchetta di 2mm diametro x 4 cm lunghezza
- Nexplanon può essere identificato mediante palpazione, ecografia, radiografia, TAC, RMN
- Se inserito correttamente l'effetto contraccettivo è immediato e ha durata di 3 anni
- la rimozione del Nexplanon può avvenire anche prima dei 3 anni, in qualsiasi momento e la funzionalità ovarica riprende entro 3 settimane (esattamente come era prima dell'uso di Nexplanon)
- l'efficacia contraccettiva dimostrata è del 99%
- Può essere utilizzato in alcuni casi in cui la pillola tradizionale è controindicata (allattamento, trombosi venosa pregressa, ipertensione arteriosa, obesità) con rischi minori rispetto all'estroprogestinico.
- L'azione contraccettiva non viene compromessa da episodi di vomito, diarrea e dalla dimenticanza dell'assunzione come per la pillola giornaliera.
- irregolarità mestruali rappresentano l'effetto collaterale più comuni dell'impianto, come avviene con gli altri contraccettivi progestinici. Una donna su 5 ha avuto amenorrea (mancanza di mestruazione).
- controindicazioni: malattia epatica acuta in atto, trombosi venose in atto, gravidanza in corso, tumori maligni sensibili agli steroidi sessuali, sanguinamento vaginale non diagnosticato, ipersensibilità al principio attivo

– quando inserire Nexplanon?

Metodo contraccettivo precedente	Timing d’inserimento
Nessuno	Giorno 1-5 del ciclo
COC, cerotto, anello	Durante intervallo libero
POP	In qualsiasi momento
Impianto sottocutaneo	Nello stesso giorno dalla rimozione
Aborto 1 trimestre	Nello stesso giorno
Aborto 2 trimestre	Giorno 21-28

N.B. se la paziente allatta dopo le prime 4 settimane dal parto!

- Nexplanon non ha effetto sulla massa ossea
- Nexplanon non ha effetti su citologia cervicale e endometriale (utero)

Letto, compreso, firmato \_\_\_\_\_

Luogo e data di inserimento \_\_\_\_\_

Braccio destro  Braccio sinistro

N° di Lotto \_\_\_\_\_

Firma del Medico Specialista

\_\_\_\_\_