

**NORME DI PREPARAZIONE RETTOSIGMOIDOSCOPIA**

Presentarsi con la richiesta del Medico curante, con la documentazione clinica ed eventuali esami precedenti. Talora è possibile che durante la rettosigmoidoscopia vengano utilizzati farmaci che rendono l'esame più confortevole e meno doloroso; in tal caso nelle ore successive all'esame sarà rigorosamente vietato guidare e consigliato di venire in struttura accompagnati o utilizzando i mezzi di trasporto pubblici. Di seguito vengono riportate le istruzioni da seguire il giorno precedente o il giorno stesso dell'esame. Si raccomanda di seguire in modo corretto le indicazioni riportate in modo tale da favorire l'identificazione di lesioni importanti evitando di dovere ripetere l'esame in tempi brevi.

Se la rettosigmoidoscopia è prenotata dalle ore 8.00 alle 12.00:

**IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:**

- Cena leggera
- Alle ore 22.00 somministrare un cistere da 100 ml (clisma-fleet) e trattenerlo per almeno 15minuti.

**IL GIORNO DELL'ESAME:**

- Almeno due ore prima dell'esame somministrare un cistere da 200 ml (Clisma-fleet) e trattenerlo per almeno 15 minuti.
- Digiuno fino al momento dell'esame.

Se la rettosigmoidoscopia è prenotata dalle ore 12.00 alle 16.00:

**IL GIORNO DELL'ESAME:**

- Colazione leggera poi digiuno fino al momento dell'esame.
- Almeno 4 ore prima della procedura somministrare un cistere da 100 ml (Clisma-fleet) e trattenerlo per almeno 15minuti.
- Almeno 2 ore prima dell'esame somministrare un cistere da 200 ml (Clisma-fleet) e trattenerlo per almeno 15 minuti.

**BIANALISI S.p.A.**

Sede Legale: Via San Rocco 42/44 — 20851 Lissone (MB)

Cod. Fisc. 02235840150 — P. IVA 00731780961 — REA MB-757881 — Cap. Soc. € 70.000,00

PEC bianalisi@pec.eleusi.at

Bianalisi Meditel: Via Vincenzo Alliata, 1 – 21047 Saronno (VA)

Tel. 02.962821 — posta.meditel@bianalisi.it — meditel-group.it

Struttura accreditata Regione Lombardia n.1427 Direttore sanitario: Dott. Pasquale Cannatelli